

HapYcom



眠くなる成分は入っていません

ヒストミン 麻黄湯液



眠くなる成分は入っていません

ヒストミン 麻黄湯液

第2類医薬品



ミックス
パッケージ

FSC® C003630

HapYcom

第2類医薬品

ヒストミン麻黄湯液

成人(15才以上)

1回1本

1日3回

15才未満

服用しないこと

保管の注意：生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

発熱
さむけ

ふしぶしの痛み 感冒 鼻かぜ

よく振って服用してください

第2類医薬品

漢方薬 Kampo Medicine

販売名：ヒストミン麻黄湯液

開け口

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

効能

体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

用法・用量

成人(15才以上) 1本(30mL) 1日3回

15才未満 服用しないこと

食前又は食間によく振ってから服用してください。食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は本質的に沈殿を含んでいます、よく振ってから服用してください。

成分・分量 90mL(30mL×3本)中

麻黄湯エキス……………2.21g
(マオウ5g、キョウニン5g、ケイヒ4g、カンゾウ1.5g)

添加物：アルコール、キシリトール、スクラロース、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料

使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1.次の人服用しないこと
体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 2.短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

- 1.次の人服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)胃腸の弱い人。(4)発汗傾向の著しい人。(5)高齢者。(6)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(8)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起ることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3.1カ月位(感冒、鼻かぜに服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- (5)生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中郷1丁目139番地

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：0120-584-419

受付時間：10時~16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

MADE IN JAPAN