

HapYcom
ハビコム

セルフメディケーション

税 控除 対象

鎮痛消炎テープ剤

第2類
医薬品

フェルビナク製剤

5.0%

肩・腰・関節・ひざ

痛みを抑える

温感

ビタミンE

貼りやすい
[3分割ライナー]

保存に便利なチャック付き袋入り

ホームパスフェルビナテープ°5.0 温感

対象年齢

15歳以上

ホームパスフェルビナテープ5.0温感

特長

- ホームパスフェルビナテープ5.0温感は痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわすフェルビナクを1枚あたり35mg配合しています。
- ホームパスフェルビナテープ5.0温感は柔軟性のある基布を使用していますので、粘着性にすぐれ関節部にもよくフィットします。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4)15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください
 - (1)目の周囲、粘膜等。
 - (2)湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください

🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、痛み、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



肩の痛み

腰痛 関節痛

効能・効果 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。
- (5)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

フェルビナク	5.0g
l-メントール	3.0g
トコフェロール酢酸エステル	2.3g

添加物としてスチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ノナン酸バニリルアミド、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

7cm

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931