

のどの殺菌・消毒

のどに直接ぬれる

長い綿棒

のどぬる



対象年齢: 2才以上

のどの殺菌・消毒

のどに直接ぬれる


のどぬる

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒 のどぬーる

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ底面及び
ビンラベルに記載）を過ぎた製品は使用しないこと

販売名：のどぬーる



第3類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分、ヨウ素(ポビドンヨード)によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 甲状腺疾患のある人
- (3) 2才未満の乳幼児

2. 長期連用しないこと

3. 大量に使用しないこと

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 患部が広範囲の人又は口内のただれがひどい人

2. 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	胸苦しさ、不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

のどの殺菌・消毒

用法・用量

適宜、適量を患部に塗布してください

<用法・用量に関する注意>

- (1) のどにぬるとき、綿等にしみこませ過ぎないように注意すること
- (2) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること
- (3) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用されること
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (5) のど用にのみ使用すること

成 分・分 量 100mL中

成分	分量	はたらき
ヨウ素	1.0g	のどの殺菌・消毒

添加物として、ヨウ化K、グリセリン、ハッカ水、香料（フェノール）を含有する

<成分・分量に関する注意>
本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがある

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらぬ湿気の少ない涼しい所に密栓して立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）

● 使用中に液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先（お客様相談室）

0120-5884-01

9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931