

HapYcom  
ハピコム

セルフメディケーション

税 控除 対象

# インドメタシン

# 冷感 0.5%

スキュータムIDクール

つらい痛みに直接浸透

# 腰痛 関節痛 ねんざ

鎮痛・消炎パップ剤

全方向  
伸縮自在

1枚サイズ 14cm×10cm

対象年齢 15歳以上

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮痛・消炎パッチ剤 Pain Relief Gel Patch

スキュータムIDクール 冷感 販売名:スキュータムIDクール



腰痛 関節痛 ねんざ

特徴

- スキュータムIDクールは、有効成分のインドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める鎮痛・消炎インドメタシンパッチ剤です。
- スキュータムIDクールは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ピッタリフィットします。
- スキュータムIDクールは、基剤中の水分により、打撲、ねんざ等による熱を持った患部を心地よく冷却します。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと  
(1)本剤又は本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。  
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないこと  
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。  
(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。  
●15歳未満の小児は使用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。
- (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用すること。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。

成分・分量 膏体100g(1000cm<sup>2</sup>)中

インドメタシン 0.5g

添加物として、マクロゴール、ℓ-メントール、酸化チタン、エデト酸Na、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、グリセリン、香料、pH調整剤、その他3成分を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



10cm 原寸大

14cm

開け口

製造販売元  
帝國製薬株式会社  
香川県東かがわ市三本松567番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
帝國製薬株式会社 お客様相談室  
電話(0879)25-2363  
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN