

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

〈外用痔疾用薬〉

痔の痛み・はれ・かゆみに

ラナンキュラスぢα坐剤

ラナンキュラスぢα坐剤は、痔の治療に有効なヒドロコルチゾン酢酸エステル、酸化亜鉛など8種の有効成分を配合した痔疾用坐剤で痔の痛み、はれ、かゆみ、出血の不快な4つの症状の改善にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります)

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 刺激感、化膿 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|---|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

口のかわき、眠気

4. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

[用法・用量]

次の量を肛門内に挿入してください。



| 年令 | 1回量 | 1日使用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15才以上) | 1個 | 1~3回 |
| 15才未満 | 使用しないこと | |

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させないでください。
- (2) 本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。
- (3) 肛門にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を厳守してください。

[坐剤のとり出し方・挿入の仕方]

①ミシン目より1個 ②上部の開け口を左右に引きはがし、③肛門内に坐剤を挿入します。すわった状態で坐剤を入れ、手でおさえて肛門に力を入れながらゆっくり立ち上がると、簡単に挿入することができます。



[成分・分量] 1個(1.5g)中

| 成 分 | 分 量 | はたらき |
|-----------------|------|--------------------|
| リドカイン | 60mg | 痔の痛みとかゆみをおさえます。 |
| ヒドロコルチゾン酢酸エステル | 5mg | 痔のはれと出血をおさえます。 |
| 酸化亜鉛 | 80mg | 患部を保護し、炎症をおさえます。 |
| イソプロピルメチルフェノール | 2mg | 細菌の感染をおさえます。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 4mg | 患部のかゆみをしずめます。 |
| アラントイン | 20mg | 傷の治りをたすけ、組織を修復します。 |
| グリチルレチン酸 | 6mg | 痔の炎症をおさえます。 |
| トコフェロール酢酸エステル | 60mg | 血流を良くし、うつ血をおさえます。 |

添加物としてハードファットを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(30℃以下)に保管してください。
特に夏期は冷蔵庫に保管してください。
- (2) 坐剤の先を下向きにして保管してください。(軟化したときの坐剤の変形を防ぐため)
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることを防ぐため)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 06-6351-2100 (代表) 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

フリーダイヤル 0120-149-931



KUDA 奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号

<http://www.okudaseiyaku.co.jp>