


HapYcom

小児用

5才～14才用



栄養ドリンク



熱による
だるさ

胃腸
障害

虚弱
体質

お子さまの

かぜ

の時などの

栄養補給に

かぜの時などの
栄養補給に

第2類医薬品

【効能】
○ 幼小児の発育期・偏食児・発熱性消耗性疾患・病中病後・胃腸障害・栄養障害などの場合の栄養補給 ○ 虚弱体質 ○ 滋養強壮
製造 小林薬品工業株式会社
販売元 岐阜県岐阜市中編1丁目139番地
お客様相談室 電話:0120-584-419
副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

飲みやすい

黒糖風味

第2類医薬品

内容量

対象年齢 5才～14才

小児用ヒストミンゴールド液S

第2類医薬品



5才~14才

1回1瓶
(30mL)

1日3回

5才未満

服用しないこと

お子さまの
かぜの時などの
栄養補給に

第2類医薬品

栄養ドリンク

販売名：
小児用ヒストミンゴールド液S

ドリンク剤 Health drinks

開け口

第2類医薬品

販売名：
小児用ヒストミンゴールド液S

用法・用量

5才~14才 1回1瓶(30mL) 1日3回

5才未満 服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3)本剤は生薬エキスを含有していますので、まれに沈んでんを生じることがありますが効果には影響ありません。よく振ってから服用してください。

成分・分量 30mL中

カンゾウエキス150mg、タウリン100mg、グルコン酸カルシウム水和物100mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム1mg、パンテノール3.3mg

添加物：クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、白糖、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料、グリセリン、バニリン、ミツロウ、トメントール、エチルバニリン

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

効能 ○ 幼小児の発育期・偏食児・発熱性消耗性疾患・病中病後・胃腸障害・栄養障害などの場合の栄養補給
○ 虚弱体質 ○ 滋養強壮

△ 使用上の注意

○ 本剤は小児用ですが、定められた一般的な注意事項を記載しています。

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと

⊠ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)むくみのある人。(4)高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。
偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

熱による
だるさ

胃腸
障害

虚弱
体質



製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶏1丁目139番地

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：0120-584-419

受付時間：10時~16時(土、日、祝日を除く)