

ご使用に際して、この添付文書をよく読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ヒフールFE液α

〈外用鎮痛消炎薬〉

第2類医薬品

■特徴

- ・ヒフールFE液αは、痛みや腫れのもとに直接作用するフェルビナクを3.0%配合した非ステロイド系の鎮痛消炎薬です。
- ・フェルビナクは、患部で痛みや腫れに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、関節・筋肉・腰・肩の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- ・血行促進成分のノナン酸バニリルアミドが滞った患部の血流を改善します。
- ・メントール配合により、塗布後心地よい清涼感があります。
- ・背中、腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい容器で、痛みの強い部位にもやさしく塗れます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、痛み、熱感、ヒリヒリ感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名前	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日2～4回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (2) 15歳未満の小児に使用させないでください。
- (3) 定められた用法・用量を守ってください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 薬剤塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (6) 患部の汗などをふき取って清潔にしてから使用してください。

【成分・分量】(100mL中)

フェルビナク…3.0g、メントール…6.0g、クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.1g、ノナン酸バニリルアミド…12.0mg、添加物として、マクロゴール400、エタノール、ジブチルヒドロキシルエン、グリチルレチン酸、pH調節剤を含有します。

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓し、立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (5) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかりと締めてください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリー等の貴金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

〔内容量〕

100mL

火気厳禁
第二石油類 水溶性 危険等級Ⅱ
(エタノール)

本品についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話番号 **0598-30-5376**

受付時間10:00～17:00(ただし、土、日、祝日は除きます)

製造販売元 **万協製薬株式会社**
三重県多気郡多気町五桂1169-142