

鎮痛・消炎パップ剤

GS リフェンダ[®]a

大判
20cm×14cm



20cm



原寸大

14cm

(きりとり線)

(点線にそって折りまげてください)


(点線にそって折りまげてください)

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎パップ剤

Pain Relief Gel Patch

第3類医薬品



肩こり 腰痛

筋肉痛

GSリフェンダ^a 大判

特徴

- ・GSリフェンダ^aは、貼り薬特有のニオイをおさえた爽香性タイプの冷感パップ剤です。
- ・高含水性の基剤を使用しており、すぐれた湿布効果を発揮します。
- ・粘着力が強く、皮膚にピタッと良くつきます。
- ・肌と同じ弱酸性です。
- ・伸縮性タイプの不織布で関節部位の貼付にも便利です。

△使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

- (1)目の周囲、粘膜等
- (2)湿疹、かぶれ、傷口

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、関節痛、骨折痛、腰痛、肩こり、筋肉疲労、しもやけ

用法・用量

表面のフィルムをはがして、1日1～2回患部に貼付して下さい。必要な時は、包帯またはテープでとめて下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

1. 定められた用法・用量を守って下さい。
2. 体の表面に脂や汗がある場合は、よく拭き取ってから貼付して下さい。
3. 本剤に触れた手で、目、鼻腔、口唇等の粘膜に触れないよう注意して下さい。
4. 小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。

成分・分量 100g(875cm²)中

成分	含量
サリチル酸グリコール	1.25g
l-メントール	0.5g

※添加物としてエドト酸Na水和物、カオリン、酸化チタン、CMC-Na、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、D-ソルビトール、グリセリン、酒石酸、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸部分中和物、カルボキシビニルポリマー、ヒマシ油、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 使用後は、未使用分を袋に戻し外気にふれないよう開封口を折り曲げて保管して下さい。
3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
4. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
5. 使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
6. 開封後は、品質保持の点からなるべく早くご使用下さい。

包装: (1枚:20cm×14cm)

製造販売元

株式会社 タカミツ

名古屋市北区上飯田東町4の68の1 〒462-0803

お問合せ先 ☎ 0120-459533

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

MADE IN JAPAN