

HapYcom ハピコム

第2類医薬品

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 成人<br>(15歳以上) | 1日2回を限度とし、<br>患部に貼付 |
| 15歳未満         | 使用しないこと             |

腰・関節・ひざ・肩

10cm×14cm

痛みを抑える

フェルビナク製剤 5.0% 大判

HapYcom ハピコム

セルフメディケーション  
税控除対象

鎮痛消炎テープ剤

第2類  
医薬品

フェルビナク製剤

大判

5.0%

腰・関節・ひざ・肩

痛みを抑える

ビタミンE

グリチルレチン酸

貼りやすい  
[3分割ライナー]

保存に便利なチャック付き袋入り

ホームパスフェルビナテープ5.0α 冷感

対象年齢  
15歳以上

## 特長

●ホームパスフェルビナテープ5.0αは痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわすフェルビナクを1枚あたり70mg配合しています。●ホームパスフェルビナテープ5.0αは柔軟性のある基布を使用していますので貼りやすく、粘着性にすぐれ関節部にもよくフィットします。

## △ 使用上の注意

## ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
  - ぜんそくを起こしたことがある人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください
  - 目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。
  - みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください

## ⊗ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状                       |
|------|---------------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状  |
|--------------------|--|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。 |

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



肩の痛み 腰痛 関節痛

効能・効果 腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

## 用法・用量

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。

成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

|               |       |
|---------------|-------|
| フェルビナク        | 5.00g |
| l-メントール       | 4.20g |
| トコフェロール酢酸エステル | 2.30g |
| グリチルレチン酸      | 0.19g |

添加物として軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

14cm

フェルビナク製剤  
5.0% 大判

第2類医薬品

MADE IN JAPAN 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂 電話(0942)83-2112

受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

開け口

10cm