

消炎鎮痛パッチ剤 Pain Relief Gel Patch

冷感アスコラルシップS

第3類
医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。



肩こり 腰痛 筋肉痛

効能・効果 腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

用法・用量

ライナーをはがし、1日1~2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

サリチル酸グリコール	2.0g
l-メントール	1.0g
トコフェロール酢酸エステル	1.0g

添加物としてエデト酸ナトリウム水和物、カルメロースナトリウム、グリセリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、pH調節剤、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、その他1成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂 電話(0942)83-2112
受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

- 特長**
- 消炎鎮痛効果のあるサリチル酸グリコールを配合していますので、打撲(うちみ)、捻挫、筋肉痛などにすぐれた効きめを発揮します。
 - 粘着性のある基剤と伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗣️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

MADE IN JAPAN

開
け
口

10 cm

14 cm