

モリピン 内服液

開封口

第3類
医薬品

服用に際しては、次の説明書きをよくお読みください。

効能・効果:ねむけ・倦怠感の除去

用法・用量

成人(15歳以上) 1びん(30mL) 1日1回服用

15歳未満 服用しないでください

●1日2回以上の服用は避けてください。

成分・分量 1びん(30mL)中

カフェイン水和物	200mg	L-リシン塩酸塩	100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	120mg	タウリン	500mg
ニコチン酸アミド	20mg	パントテン酸ナトリウム	30mg
チアミン塩化物塩酸塩	10mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	2mg
ピリドキシン塩酸塩	1mg		

添加物:クエン酸、クエン酸Na、L-グルタミン酸Na、カラメル、白糖、ブドウ糖、安息香酸Na、パラベン、香料(アルコール0.15mL以下)

使用上の注意

【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 1.次の人は服用しないでください(1)次の症状のある人 **胃酸過多**(2)次の診断を受けた人 **心臓病、胃潰瘍** 2.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の眠気防止薬 3.コーヒーやお茶などのカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください 4.短期間の服用にとどめ、連用しないでください【相談すること】1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)授乳中の人 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

眠気防止薬 Anti-drowsiness drug

モリピン内服液

第3類医薬品



製造販売元
森田薬品工業株式会社
広島県福山市大門町野々浜1059番地
お客様相談室:電話(084)943-8171

副作用被害救済制度
☎ 0120(149)931

MADE IN JAPAN

HapYcom

コーヒー風味



第3類医薬品

ねむけ だるさ

モリピン内服液

カフェイン
200mg
配合

対象年齢 成人15歳以上