

# エスタロンモカ12<sup>®</sup>

第3類医薬品


## 眠気除去薬 ねむけ・だるさに

- 仕事中や勉強中、“ねむけ”“だるさ”で能率が上がらない。でも、もうひとがんばり…。エスタロンモカ12はこんなときに役立つ、ねむけ除去剤です。
- コーヒー3~4杯分のカフェイン(1回量中)が、大脳皮質に作用してねむけを除きます。
- ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>がカフェインとともに働いて倦怠感(だるさ)をとります。
- 携帯に便利なPTP包装です。

### こんなときに…



会議に



深夜の残業に



受験勉強に

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください
  - (1)次の症状のある人。胃酸过多
  - (2)次の診断を受けた人。心臓病、胃潰瘍
- ② 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の眠気防止薬
- ③ コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください
- ④ 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



### 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)授乳中の



- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸

**効能・効果**

睡気(ねむけ)・倦怠感の除去

**用法・用量**

次の1回量を1日2回を限度として服用してください。  
服用間隔は6時間以上おいてください。

年齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	2錠	× 服用しないこと

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)6時間以内の連続服用は避けてください。
- (3)かますに、水又はぬるま湯で服用してください。  
(かむと苦味があります。)
- (4)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



(PTPシートの取り出し図)

**成 分**


2錠中

無水カフェイン	200mg
チアミン硝化物(ビタミンB <sub>1</sub> 硝酸塩)	5mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	5mg
シアノコバラミン(ビタミンB <sub>12</sub> )	7.5μg

添加物：カルメロースNa、クロスカルメロースNa、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ポビドン、マクロゴール、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、没食子酸プロピル、カラメル

**保管及び取扱い上の注意**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

**お問い合わせ先**

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒163-1488 東京都新宿区西新宿 3-20-2

<https://www.ssp.co.jp/>