

〔効能効果〕 創傷面の殺菌・消毒

〔用法用量〕 本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗つ  
てください。

〔用法用量に関する注意〕

(1)用法用量を厳守してください。(2)局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。(3)過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。(4)広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。(5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(6)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(7)外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕

エタノール ( $C_2H_6O$ ) 76.9 ~ 81.4vol%を含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)火気に近づけないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔使用法〕

青キャップをとり瓶を倒立し、容器を軽くおさえ、脱脂綿又はガーゼに出して使用してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

HapYcom

第3類医薬品

殺菌消毒薬  
日本薬局方  
**消毒用エタノール**

Ethanol for  
Disinfection



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5822

殺菌・消毒に

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。 A

⚠ 使用上の注意

してはいけない (守らないと現在の症状が悪化したり、  
ないこと 副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください  
粘膜 (口唇等)、目の周囲

相談する 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登  
こと 録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりア  
レルギー症状を起こしたことがある人。(3)患部が  
広範囲の人。(4)深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可  
能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持  
って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使  
用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談してください