

【効能効果】きずの消毒・洗浄

【用法用量】そのままの液又は2~3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗ってください。

〈用法用量に関する注意〉

(1)用法用量を厳守してください。(2)顔面など皮ふの敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始してください。(3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(5)外用にのみ使用してください。

【成分分量】過酸化水素(H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 2.5~3.5 w/v%を含有します。

添加物：フェナセチン、リン酸

【保管及び取扱い上の注意】


(1)直射日光の当たらない冷所(30℃以下)に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5)保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップを開けてください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

HapYcom

第3類医薬品

外用殺菌消毒薬  
日本薬局方  
**オキシドール**



きずの消毒・洗浄に

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないでください

相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)患部が広範囲の人。(4)深い傷やひどいやけどの人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

