

ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



第2類医薬品

大人用トラベックα内服液 (乗り物酔い薬)

大人用トラベックα内服液は、乗り物に弱い方を苦しい乗り物酔いから解放し、思い出に残る楽しい旅行や釣りなどができるようにと作られました。乗り物酔いは、自律神経の興奮が誘因となっています。ですから、これを抑えれば乗り物酔いは無くなるわけです。この製品には、副交感神経遮断作用、中枢抑制作用を有するスコポラミン臭化水素酸塩水和物が処方されており、乗り物酔いの誘因を抑え、乗り物酔いによるめまい・吐き気・頭痛を防ぎます。大人用トラベックα内服液1びんを乗り物に乗る約30分前に飲んでいただければ、乗り物酔いが予防され、乗り物を利用してのレジャーを楽しく過ごすことができます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他の乗り物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
 緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

裏面もお読みください。

【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】

下記の量を服用してください。

年 齢	使用目的	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	乗物酔いの予防	1びん(10mL)を 乗車船30分前に服用すること	2回まで
	乗物酔いの症状発現時の 追加服用	1びん(10mL)を4時間以上の 間隔をおいて服用すること	
15歳未満	服用しないでください。		

<用法及び用量に関連する注意>

用法・用量を厳守すること。



【成分・分量】1日量(10mL×2)中


スコポラミン臭化水素酸塩水和物……………0.5mg

無水カフェイン……………100mg

※添加物としてクエン酸、白糖、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求め
のお店又は下記にお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室

電話 0595-21-3200

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5