

HapYcom  
ハピコム

開けやすい大口ボトル



HapYcom

処方満量

ノンシュガー  
眠くなる成分は  
入っていません

ヒストミン  
葛根湯液

かぜの

ひきはじめに  
鼻かぜ 頭痛 肩こり

第2類医薬品

セルフメディケーション  
税控除対象

# ヒストミン 葛根湯液

HapYcom

第2類医薬品

ヒストミン 葛根湯液

成人(15才以上)

1回1本

1日3回

15才未満

服用しないこと

保管の注意: 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着します  
ので、瓶を横にして保管しないでください。

かぜの  
ひきはじめに  
鼻かぜ 頭痛  
肩こり

満量処方

眠くなる成分は  
入っていません

ノンシュガー

対象年齢

15才以上

体力中等度  
以上の方に

第2類医薬品

かぜの  
ひきはじめに  
鼻かぜ 頭痛 肩こり

よく振って服用してください

## 第2類医薬品

漢方薬 Kampo Medicine

販売名:ヒストミン葛根湯液

## 開け口

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう商品と共に大切に保管してください。

### 効能

体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

### 用法・用量

|           |                |      |
|-----------|----------------|------|
| 成人(15才以上) | 1回1本<br>(30mL) | 1日3回 |
| 15才未満     | 服用しないこと        |      |

食前又は食間によく振ってから服用してください。食間とは食事と食事の間で、前の食事から2~3時間後のことです。

#### 〈用法・用量に関する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 本剤は本質的に沈殿を含んでいます、よく振ってから服用してください。

### 成分・分量 90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス……………4.34g  
(カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)

添加物:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、キシリトール、スクロース、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、アルコール、香料

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

### ⚠ 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸の弱い人。(5) 発汗傾向の著しい人。(6) 高齢者。(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9) 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位                                      | 症 状   |
|---|---|
| 皮膚  | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器                                       | 吐き気、食欲不振、胃部不快感                                    |
| まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。 |   |
| 症状の名称                                     | 症 状   |
| 偽アルドステロン症、ミオパシー                           | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。   |
| 肝機能障害                                     | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。
- 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないでください。

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶴1丁目139番地

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話:0120-584-419

受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

MADE IN JAPAN