

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

〈外用痔疾用薬〉 痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に 第2類医薬品

ラナンキュラスα注入軟膏a

ラナンキュラスα注入軟膏aは、痔の治療に有効なヒドロコルチゾン酢酸エステル、酸化亜鉛など8種の有効成分を配合した痔疾用軟膏で痔の痛み、かゆみ、はれ、出血の不快感4つの症状の改善にすぐれた効果を発揮します。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

2. 長期連用しないでください



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

〔注入時〕 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

〔塗布時〕 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

〔用法・用量〕

〔注入する場合〕 ノズル部分を肛門部に挿入し、全量をゆっくり注入してください。




年 令	1回量	1日使用回数
成人(15才以上)	1個	1~3回
15才未満	使用しないこと	

〔塗布する場合〕 次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

年 令	1回量	1日使用回数
成人(15才以上)	適量	1~3回
15才未満	使用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させないでください。
- (2)肛門部にのみ使用してください。
- (3)肛門内に注入する場合、ノズル部分のみを挿入してください。
- (4)定められた用法・用量を厳守してください。

注入する場合		塗布する場合
① 	② 	
①キャップを取り、すべりを良くするために軟膏を少し出します。	②ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入し、ボディを押したまま引き抜いてください。 ※全量を1回で注入してください。	キャップを取り、軟膏をそのまま患部に塗布するか、ガーゼなどにのぼして患部にあててください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

●本製品は注入式のため容器に軟膏が少し残りますが、残量を見込んで充填しています。また、寒い時期や低温で保管した場合は、軟膏が硬くなり、出しにくくなりますが手の中で容器を握って温めると軟らかく出しやすくなります。

〔成分・分量〕 1個(2g)中

成分	分量	はたらき
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	痔のはれと出血をおさえます。
リドカイン塩酸塩	60mg	痔の痛みとかゆみをおさえます。
フェニレフリン塩酸塩	3mg	患部の出血とはれをおさえます。
酸化亜鉛	80mg	患部を保護し、炎症をおさえます。
イソプロピルメチルフェノール	2mg	細菌の感染をおさえます。
グリチルレチン酸	10mg	痔の炎症をおさえます。
アラントイン	20mg	傷の治りをたすけ、組織を修復します。
トコフェロール酢酸エステル	60mg	血流を良くし、うっ血をおさえます。

添加物としてサラシミツロウ、流動パラフィン、BHT、白色ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。開封後は品質保持のため、なるべく早く使用してください。
- (5)使用済みの容器等は、トイレに流さないでください。

痔治療のポイント

1. トイレでは無理にいきまず3分以内を心がけましょう。排便後はぬるま湯で洗うなど、肛門を清潔にしましょう。ペーパーで強くこすらないようにしましょう。
2. 便通をよくするために規則正しい生活と運動をしましょう。野菜や繊維質を多くとりお酒や刺激物をひかえましょう。
3. 患部を清潔にするため毎日の入浴を心がけましょう。入浴中は、おしりに負担のないリラックスした姿勢で。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎06-6351-2100(代表) 受付時間9:00~17:00(土日祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎フリーダイヤル 0120-149-931



発売元
奥田製薬株式会社

大阪市北区天満1丁目4番5号
<https://www.okudaseiyaku.co.jp/>



製造販売元
大昭製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168