

HapYcom  
ハピコム

第2類医薬品

のむ治療薬

排膿散

はいのうさん

化膿でお困りの方に

歯肉炎  
扁桃炎に

漢方製剤



排膿散エキス錠J

体力中等度以上で、患部が化膿する方に



対象年齢 5才以上

切り口

切り口

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。 開封後はチャックを閉めて保管してください。

漢方製剤

排膿散

Hainosan

販売名：排膿散エキス錠J

第2類医薬品

## △ 使用上の注意



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(1)医師、歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位

症状

消化器

胃部不快感

**効能・効果** 体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症：化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

成人(15才以上)	1回3錠	1日3回
7才以上15才未満	1回2錠	
5才以上7才未満	1回1錠	
5才未満	服用しないこと	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 食間とは食後2～3時間を指します。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。(5)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## 成分・分量 本剤9錠中

日局キジツ	2.25g	日局シャクヤク	2.25g
日局キキョウ	1.125g		

より抽出した排膿散料乾燥エキス1.875gを含有しています。

添加物：無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1  
発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 TEL 045-593-2136  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931