

効能・効果 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量

成人(15歳以上) 1日1回 1回1瓶(100mL)

15歳未満 服用しないこと

成分・分量 1日量(100mL)中

リボフラビン(ビタミンB₂) 2mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆) 5mg、ニコチン酸アミド40mg、無水カフェイン50mg、タウリン3000mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、L-バリン50mg、L-ロイシン100mg、L-イソロイシン50mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム500mg、ローヤルゼリーチンキ50mg(原生薬換算量50mg)、インヨウカクエキス20mg(原生薬換算量110mg)、エゾウコギエキス15mg(原生薬換算量210mg)

添加物:白糖、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、カラメル、香料(アルコール0.2mL以下)

●本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、これは本剤中のリボフラビンによるもので心配ありません。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

アスゲン製薬株式会社

岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008

お客様相談窓口 ☎ 0572-68-1865

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

HapYcom

アスピーDX

4000_α

タウリン3000mg アミノ酸類*1000mg
3種類の生薬成分

滋養強壮、

肉体疲労時の栄養補給に

第2類医薬品

使用上の注意 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること●皮膚:発疹/消化器:胃部不快感、下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取り扱い上の注意

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2.小児の手の届かない所に保管すること。3.他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。4.使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。5.本剤は生薬を配合しているため、まれに沈殿や浮遊物を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

1瓶(100mL)あたり85kcal

*アミノ酸類(L-バリン/L-ロイシン/L-イソロイシン/L-アルギニン塩酸塩/L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム)

MADE IN JAPAN