

2024年4月作成

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

デリケートな部位のかゆみ、かぶれに フルーツ[®] EXプラス

第2類医薬品 鎮痒消炎剤

製品特長

- 6つの有効成分（抗ヒスタミン剤：ジフェンヒドラミン、抗炎症剤：グリチルレチン酸、殺菌剤：イソプロピルメチルフェノール、局所麻酔剤：リドカイン、血流改善剤：トコフェロール酢酸エステル、代謝促進：パンテノール）をバランスよく配合した鎮痒消炎剤です。
- デリケートな部分にも安心して使用できる低刺激性のクリームです。
- 親水性のクリームですので、のびがよく、べとつきません。

本剤にステロイド成分は配合されていません。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

カンジダ症、トリコモナス症等の原因によるかゆみは本剤で治療できません。医師による治療が必要になります。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

（裏面もご覧ください。）

【用法・用量】

- 1 日数回、適量を患部に塗布してください。
- 〈用法・用量に関連する注意〉
- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】（100g 中）

成 分	分量	は た ら き
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	1.0g	患部の炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.5g	殺菌作用で、雑菌の繁殖を抑えます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用でかゆみを和らげます。
トコフェロール酢酸エステル	2.0g	血行を促進し、治療を助けます。
パンテノール	1.0g	荒れた皮ふを正常にすることを助けます。

添加物として、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ミリスチン酸オクチルドデシル、イソステアリン酸、ステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、香料、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、エデト酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチルを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 使用期限（ケース及びチューブに表示）を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室
TEL：076-435-0878

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

【製造販売元】

新新薬品工業株式会社

富山県富山市今市324番地