

開封口

第2類医薬品

抗真菌薬(水虫治療薬) Antifungal Drug

販売名: ヒフルエース液α

効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

成分・分量(100mL中)

ビホナゾール	1.0g
ベンザルコニウム塩化物	0.05g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.5g
クロタミトン	5.0g
リドカイン	2.0g
グリチルレチン酸	0.5g
ーメントール	2.0g

添加物: 1,3-ブチレングリコール、マクロゴール、リン酸、エタノール

(成分に関連する注意)

アルコールを含んでいますので、塗布時にしみる場合があります。

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 外用にのみ使用してください。

〈容器の使用方法〉

- 使用前に、容器の先端を上に向けて、手の指で中栓の先を2~3回空押しして中の空気を抜いてください。(暑い時期、高温の場所に置かれた場合や薬液が少なくなった場合などに、容器内の圧力が高まり薬液が多く出ることがありますので、これを防ぐためです。)
- 使用するときには容器を下向き又は斜めにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。容器の先端を患部から離すと液が出なくなります。(強く押し当てたり、容器胴部を強く握ると薬液が多く出ます。)

省資源化のため、箱が添付文書を兼ねています。
ご使用に際して、この箱の記載内容を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の部位には使用しないでください
 - 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
 - 湿疹。
 - 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

☎ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 乳幼児。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が顔面又は広範囲の人。
 - 患部が化膿している人。
 - 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、ただれ、乾燥感、ヒリヒリ感

- 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

HapYcom

税 控除 対象

水虫液

1日1回で効く

抗真菌成分 かゆみ止め成分

ヒフルエース液 α

ビホナゾール配合



第2類医薬品

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 本剤は合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、床や家具等に付着しないようにしてください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

目には入れないこと

火気厳禁

第二石油類 水溶性 危険等級Ⅲ
(エタノール)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造販売元

万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142

万協製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0598-30-5376
受付時間 10:00~17:00
(ただし、土、日、祝日は除きます。)

MADE IN JAPAN