

胃乃源胃散α

芳香性健胃制酸薬

飲み過ぎ
胸やけ
胃もたれ6種の
健胃生薬
配合

対象年齢 8才以上

成分・分量 4.6g(大人1日量)中

炭酸水素ナトリウム	1800mg	胃酸を中和し、胸やけ、胃酸過多、 胃の痛みなどを改善します。
沈降炭酸カルシウム	1500mg	
炭酸マグネシウム	380mg	食欲不振や胃弱などを改善します。
ケヒ末	500mg	
ゲンチアナ末	45mg	胃のもたれや胃の痛みなどを改善します。
ウイキョウ末	50mg	
ショウキョウ末	20mg	胃炎や消化不良などを改善します。
ニガキ末	10mg	
チンピ末	10mg	

添加物として軽質無水ケイ酸、カンゾウ末、レーメントール、キシリトール、アスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、バレイショデンプンを含みます。

〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限(缶底部に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

KUDA 奥田製薬株式会社
大阪市北区天満1丁目4番5号

芳香性健胃制酸薬 Aromatic Stomachic Antacid

Made in Japan

お客様相談窓口 ☎ 06-6351-2100(代表)
受付時間9:00~17:00(土日祝日を除く)

服用の前に製品に記載された説明文を必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)次の診断を受けた人。腎臓病、甲状腺機能障害
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)

用法・用量

1日3回、食後水又はさゆにて服用してください。

大人(15才以上)	1回 1サジ 1.53g	1日3回
11才以上15才未満	1回2／3サジ 1.02g	
8才以上11才未満	1回1／2サジ 0.77g	
8才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2)用法・用量を正しく守って、添付のサジを清潔に使用し、服用してください。