

HapYcom

ハピコム

第2類医薬品

葛根湯エキス顆粒

かぜのひきはじめに

3包(4131mg)中 葛根湯乾燥エキス 3483mg

カッコン.....6.46g	マオウ.....3.23g
タイソウ.....3.23g	ケイヒ.....2.42g
シャクヤク...2.42g	カンゾウ...1.62g
ショウキョウ...0.81g	

体力中等度
以上の方に

鼻かぜ

肩こり

頭痛

葛根湯エキス顆粒WS-R 第2類医薬品

効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。

成人(15才以上)	1回 1包
7才以上15才未満	1回 2/3包
4才以上 7才未満	1回 1/2包
2才以上 4才未満	1回 1/3包
2才未満	1回 1/4包

(1)用法用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

成分・分量 3包(成人1日量)中

葛根湯エキス(4/5量).....3483mg
 [カッコン6.46g、マオウ3.23g、タイソウ3.23g、
 ケイヒ2.42g、シャクヤク2.42g、カンゾウ1.62g、
 ショウキョウ0.81g]

添加物としてマクロゴール、ステアリン酸Mg、ケイ酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5)表示の期限内に服用して下さい。

服用前にこの説明書を必ず
お読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

第2類医薬品

葛根湯エキス顆粒WS-R

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないで下さい 生後3ヵ月未満の乳児

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人
(5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) むくみ、排尿困難の症状のある人
(9) 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

第2類医薬品

葛根湯^{エキス}顆粒

かぜのひきはじめに

3包(4131mg)中
葛根湯乾燥エキス 3483mg

体力中等度
以上の方に

鼻かぜ

肩こり

頭痛

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879

■お問い合わせ先
滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電話:(0748)88-3180(大代表)
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931