

HapYcom

ハピコム

第2類医薬品

葛根湯液

かぜのひきはじめに

眠くなる成分は入っていません

鼻かぜ

鼻炎

頭痛

対象年齢 15才以上



葛根湯液WS

第2類医薬品

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸の弱い人 (5) 発汗傾向の著しい人 (6) 高齢者 (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8) 次の症状のある人：むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この商品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

成人(15才以上) 1回1本、1日3回食間によく振ってから服用して下さい。

<用法用量に関連する注意>

(1) 用法用量を厳守して下さい。(2) 本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

成分・分量 90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス……………4340mg
[カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、ケイヒ3.0g、シャクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、ショウキョウ1.0g]

添加物としてハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシル、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
 - (4) 表示の期限内に服用して下さい。
- 配合成分により、沈殿を生じます。よく振って服用して下さい。
- 生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

保管の注意：生薬成分による沈殿物が瓶口に付着しますので、瓶を横にして保管しないで下さい。

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電話：(0748) 88-3180(大代表)

受付時間：9時から17時まで

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120(149)931