2013年11月
（記載要領変更に伴う改訂）

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

アレルギー用薬

ルキノン錠AZ

第２類医薬品

花粉やハウスダストなどにより、鼻がつまる、鼻水が止まらないなどのアレルギー症状はつらいものです。**ルキノン錠AZ**は、アレルギー反応の引き金となるヒスタミンやロイコトリエンの放出や働きを抑えるほか、花粉などのアレルゲンに対する喉や鼻粘膜の過剰反応を弱めるアゼラスチン塩酸塩を配合したアレルギー専用薬です。これらの働きにより、鼻や皮膚のアレルギー症状の緩和にすぐれた効果をあらわします。

⚠使用上の注意

☒してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1.次の人は服用しないこと

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)15才未満の小児。
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。

2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬）

3.服用前後は飲酒しないこと

4.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

（眠気等があらわれることがある。）

5.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

6.長期連用しないこと

相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。
(2)高齢者。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)アトピー性皮膚炎、またはアトピー素因があると診断を受けた人。
(5)気管支ぜんそくの診断を受けた人。
(6)発熱やせき、黄色で粘りのある鼻みずなどのかぜ症状がある人。
(7)鼻炎の場合でアレルギー性鼻炎か、かぜによる鼻炎かわからない人。または、皮膚の症状が「じんましん、湿疹・かぶれ」によるものか、虫さされや化膿等他の原因によるものかわからない人。

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤
消化器	吐き気・嘔吐、口内及び口周囲のあれ、食欲不振、胸やけ、胃部不快感、腹痛
精神神経系	倦怠感、めまい、頭痛、手足のしびれ
循環器	動悸
呼吸器	息苦しさ
泌尿器	頻尿、排尿困難、血尿
肝臓	全身のだるさ、皮膚や白目が黄色くなる
その他	顔面のほてり、鼻乾燥、浮腫、月経異常

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、便秘、下痢、眠気

4. じんましん、湿疹・かぶれなどの皮膚の症状の場合で、症状の軽減が見られるが繰り返し症状が起こるなど1週間以上症状が継続する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 鼻炎の症状の場合で2週間以上服用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効　　能

●花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻づまり、鼻水、くしゃみ
●じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮ふのはれ、かゆみ

用法・用量

次の量を、水又はぬるま湯で朝食後及び就寝前に服用してください。

年　齢	1　回　量	服用回数
成人（15才以上）	**2錠**	**1日2回**
15才未満	服用しないでください。	

ただし、鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮ふの症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善がみられない場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 定められた用法・用量（必ず1回2錠、1日2回）を厳守してください。
(2) 花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
(3) 早めに飲みこんでください。長く口中にとどめると苦味を感じることがあります。これは成分自身の苦味によるものです。また、服用後にも苦味を感じることがあります。
(4) 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

〈錠剤の取り出し図〉

成分・分量　4錠中

成　分　名	分　　量
アゼラスチン塩酸塩	2mg

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン、粉末還元麦芽糖水アメ、乳糖水和物、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
(4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
小林薬品工業株式会社　お客様相談室
電　話：０５８－２７８－３９３３
受付時間：10時～16時（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
☎0120－149－931（フリーダイヤル）

製造販売元　小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鶉1丁目139番地
本社所在地　東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

M3K
2